

Вчасний скринінг на туберкульоз

Чому це важливо зараз

В умовах повномасштабної війни ризики поширення туберкульозу зросли. На імунну систему дітей і дорослих негативно впливають:

- постійний стрес;
- перебування в укриттях та скупчених приміщеннях;
- порушення звичного режиму харчування та сну;
- переохолодження;
- вимушене переміщення населення.

Через це організм стає **більш вразливим до інфікування**, а прихована (латентна) ТБ-інфекція швидше переходить в активну форму.

Що ви можете зробити

1 Дізнатися більше

Відвідуйте інтерактивні лекції та бесіди в закладі освіти про фактори ризику, перші симптоми туберкульозу та його профілактику.

2 Пройти скринінг

Систематичне анкетування на наявність ризиків туберкульозу та ТБ-інфекції. Допомагає виявити проблему на ранньому етапі.

3 Отримати консультацію

Якщо первинний скринінг викликав підозри, фахівці допоможуть із діагностикою та додатковим обстеженням.

На що звернути увагу

Зверніться до **сімейного лікаря**, якщо в дитини або в когось із родини спостерігається:

- кашель, що триває понад 2–3 тижні;
- підвищена температура без явної причини;
- втрата ваги чи апетиту;
- підвищена втомлюваність, пітливість, особливо вночі.

Пам'ятайте

- **Раннє виявлення** дає найкращі шанси на швидке й повне одужання.
- Скринінг простий і не потребує великих зусиль.
- Не відкладайте обстеження: вчасно виявлену хворобу легше вилікувати та не допустити її поширення.
- Підтримуйте імунітет дитини: повноцінне харчування, достатній сон, тепло, прогулянки, коли це безпечно.